

PRECAUCIONES

ANASECT 2,5 EC, es un insecticida perteneciente al grupo químico de los piretroides.

- Mantener fuera del alcance de los niños, personas no responsables y animales domésticos.
- No almacenar junto con alimentos.
- Conservar este producto en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega fresca, seca, bien ventilada, segura y bajo llave.
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protector facial completo o de nariz y boca, antiparras y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Asegurarse de que no se encuentren presentes personas sin protección adecuada y animales domésticos durante la aplicación.
- De ocurrir algún malestar o signo de intoxicación durante su aplicación el operador debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
- Cuidar de no aplicar sobre cursos de agua y sobre insectos beneficiosos.

PRECAUCIONES DESPUES DE LA APLICACION

- Lavar bien su ropa y equipos de trabajo, con agua y detergente biodegradable. Verter este lavado, así como los sobrantes de líquidos de la pulverización, en suelos sin cultivar y lejos de cursos o fuentes de agua.
- Destruir el envase vacío. No reutilizar el envase.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia 10 - 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón alcalino.
- En caso de inhalación, poner al afectado en un lugar bien ventilado o al aire libre.
- En caso de ingestión, no inducir el vómito y dar a beber agua con carbón medicinal para absorber el insecticida. Mantenga al afectado boca abajo mientras consigue atención médica.
- Si se observan signos de intoxicación (náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea y ocular y dificultad respiratoria) debida al mal uso del producto o a descuidos, procurar atención médica inmediata y mostrar al facultativo la etiqueta del producto.

EN CASO DE EMERGENCIA, COMUNICARSE INMEDIATAMENTE CON RITA-CHILE
AL : (2) 777 1994

- **SÍNTOMAS POSIBLES:** Irritación dermal, ocular y de las vías respiratorias, náuseas, vómitos, cólicos, diarrea, cefalea, vértigo, debilidad, temblores musculares y convulsiones.
- **TIEMPO DE REINGRESO:** 120 minutos (45 - 60 minutos de buena ventilación)

- Fabricado y Distribuido por:
Agrícola Nacional S.A.C. e I.
Cámino Noviciado Norte, Lote 73-B,
Lampa, Santiago - CHILE
www.anasaccontrol.cl



INSECTICIDA PIRETROIDE • CONCENTRADO EMULSIONABLE

ANASECT 2,5 EC



ANASECT 2,5 EC, es un insecticida piretroide de contacto e ingestión, recomendado para el control de plagas de insectos voladores y rastreros.



COMPOSICIÓN:

- Praletrina 2,5 g.
- Ingredientes inertes c.s.p. 100 cc.

Reg. I.S.P. N° P-378/18

USO PROFESIONAL

1 LITRO

INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

ANASECT 2,5 EC, es un insecticida piretroide de cuarta generación, de amplio espectro cuya característica principal es su extraordinario efecto de desalojo y volteo. Usado en bajísimas concentraciones presenta una alta acción fulminante (knock down) y desalojo (flushing out) contra moscas, zancudos, arañas, pulgas y otros insectos. Puede ser usado aisladamente cuando no se desea efecto residual o en asociación con otros insecticidas de acción prolongada (ATONIT o CYPERKILL). Contra baratas debe ser usado preferencialmente con otros insecticidas de acción residual. Está indicado para aplicaciones interiores y exteriores, en residencias, instalaciones comerciales e industriales.

MECANISMO DE ACCION: ANASECT 2,5 EC al igual que otros piretroides afecta al sistema nervioso del insecto, provoca parálisis y luego la muerte de éste.

RECOMENDACIONES DE USO

TRATAMIENTO RESIDUAL SOBRE SUPERFICIES					
INSECTOS A CONTROLAR	DOSIS USO AISLADO	DOSIS USO CON OTRO INSECTICIDA	DILUIR EN	AREA A CUBRIR	DOSIS DEPOSITADA (i.a/m ²)
MOSCAS, ZANCUDOS, ARANAS, PULGAS Y OTROS INSECTOS	50 cc	25 cc.	5 Lt. de agua	100 m ²	12.5 - 6.25 mg.
BARATAS	No recomendable	25 cc	5 Lt. de agua	100 m ²	12.5 - 6.25 mg.

CONSIDERACIONES DE USO

- Cuando se utilice el producto aisladamente se recomienda realizar aplicaciones dirigidas directamente sobre los insectos o sus escondites a través de micropulverización en base a algún solvente orgánico común (parafina o aguarrás mineral).
- Diluir en agua en las concentraciones indicadas, agitar la mezcla, asperjarlo sobre murallas, pisos, techos, entretechos, o sobre cualquier superficie donde se posen los insectos.

TRATAMIENTO EN ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS

INSECTOS A CONTROLAR	METODO DE APLICACION	LUGAR DE APLICACION	DOSIS DEL PRODUCTO	DILUIR EN	AREA A CUBRIR
TODO TIPO DE INSECTOS	Ultra - Bajo Volumen o Nebulización Térmica	INTERIOR	25 - 50 cc.	1 Lt. de agua	3.000 m ³
		EXTERIOR		1 Lt. de diesel o kerosene	4.000 m ²

CONSIDERACIONES DE USO

- Se puede aumentar su poder penetrante utilizando algún solvente orgánico común (parafina o aguarrás mineral) o aplicado en Termonebulización o Ultra bajo volumen (ULV).
- El volumen a usar para diluir y el régimen de descarga, están dados por el tipo de equipo a utilizar.

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

CUIDADO

