



POTENTE RATICIDA QUE CONTROLA EFECTIVAMENTE ROEDORES URBANOS Y SILVESTRES.



- ✓ Potente Raticida Anticoagulante de última generación.
- ✓ Ratador controla todo tipo de ratas, ratones y lauchas con una sola ingestión.
- ✓ Los roedores mueren a los 5 a 8 días después de la ingesta, lejos del lugar de consumo.
- ✓ Su presentación en cebo le otorga características de alta palatabilidad y aceptación por parte de los roedores.
- ✓ Su ingrediente activo Bromadiolona, es el raticida menos tóxico para humanos y animales domésticos.



NO ESPERE MÁS, CON RATADOR USTED CONTROLARÁ DE UNA SOLA APLICACIÓN LOS MOLESTOS ROEDORES.

Point Chile S.A.
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 9950, oficina 10, Quilicura, Santiago.
Teléfono: 56 2 23849840
Zonal III y IV Regiones: +569 99692317 / Zonal Región Metropolitana, V y XV Regiones: +56-9 93194024 /
Zonal VI Región: +569 99692316 / Zonal VIII y IX Región: +569 40054617 / Zonal Regional Sur: +569 99692313
Product Manager Safe Home: +569 99692313 / E-mail: ventas.chile@pointamericas.com
Sitio Web: www.point.cl



Point
ENTREGAMOS CALIDAD

**INGREDIENTE ACTIVO:**

Bromadiolona

NOMBRE QUÍMICO:

(*)3-(4-Bomofenil)-3Hidroxi-1Fenilpropil-4-Hidroxil cumarina

GRUPO QUÍMICO:

4-Hidroxycumarina

CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN:

0,005% (Bloque, Pellets y Pasta)

MODO DE ACCIÓN:

Ingestión

FABRICANTE/FORMULADOR:

Point International Ltd. Inglaterra

DISTRIBUIDOR EN CHILE:

Point Chile S.A.

ANTÍDOTO:

Vitamina K1

TOXICIDAD:

Grupo IV (Productos que normalmente no ofrecen peligro)

REGISTRO ISP:

Ratador Bloque P-774/16

Ratador Pellets P-773/16

Ratador Pasta P-727/15

RECOMENDACIONES DE USO**LUGAR**

Casas, edificios, hoteles, restaurantes y lugares públicos. En exterior.

Bodegas, almacenes, pesqueras, agroindustrias, mataderos, etc. Perímetro exterior e interior.

DOSIS

20 a 40 gramos por punto de cebamiento separado entre 5 a 10 metros, según grado de infestación.

20 a 40 gramos en cebaderas separadas entre 5 a 10 metros en lugares protegidos.

INTERVALO

Verificar el consumo a los 15 a 20 días desde la primera postura. Reponer los cebos hasta que cese la ingestión.

Verificar el consumo a los 15 días. Reponer los cebos hasta que cese la ingestión.

PRECAUCIONES Y COMPATIBILIDAD

- Leer y seguir cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.
- Utilizar guantes al manipular el producto.
- El producto debe ser manipulado por personas responsables.
- Almacenar en lugar fresco, seco, lejos de alimentos y animales domésticos.
- En caso de ingestión trasladar a la persona con el envase al centro médico más cercano.
- No se requiere tiempo de espera para reingreso al área tratada.
- Al finalizar su aplicación, lave sus manos con abundante agua y jabón.
- Elimine y entierre los roedores muertos y elimine el cebo no consumido.

PRESENTACIONES**PELLETS**

50 gramos,
250 gramos,
500 gramos,
10 Kilos

**BLOQUES**

100 gramos,
500 gramos,
1 Kilo,
10 Kilos

**PASTA**

250 gramos,
500 gramos,
5 Kilos



En caso de emergencia comunicarse con RITA CHILE: (56 2) 2777 1994

ADVERTENCIA: Este folleto sólo contiene información de carácter referencial y no posee toda la información necesaria para el adecuado uso y manejo de los productos. Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto.

