

Brodifacoum 0,005%

COMPOSICIÓN

Brodifacoum CAS 56073-10-0.....	0,005 g
Bitrex*.....	0,001 g
Derivados de cereales c.s.....	100 g

* Benzoato de denatonium.

Grupo químico: Hidroxicumarina.

Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado) Producto de Banda Verde.

Condición de Venta: General - Uso Doméstico.

DESCRIPCIÓN

KLERAT® es un roenticida anticoagulante de segunda generación que controla eficazmente guarenes o ratas de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), ratas del tejado (*Rattus rattus*), lauchas o ratones (*Mus musculus*) y otras especies peligrosas y dañinas.

KLERAT® controla a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1,3 g en Ratas y 0,2 g en Lauchas y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre **a partir del tercer día de la primera ingesta.**

KLERAT® contiene **Bitrex®**, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y **no siendo detectado por los roedores.**

RECOMENDACIÓN DE USO

- **KLERAT® Bloque** es un raticida listo para usar (cebo), especialmente indicado para el control de roedores en casas, bodegas, industrias, planteles animales y otros.
- Aplicar **KLERAT® Bloque** tan pronto se observen las primeras señales de los roedores (fecas, huellas, roeduras, manchas, etc.).
- Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos (ej. caja cebadora o tubo de PVC), en todos los lugares donde los roedores circulen, viven y alimenten (alcantarillado, canales de desagüe, vigas, jardines, árboles, madrigueras).
- En caso de nuevos roedores repita la aplicación cada 7 ó 14 días hasta que cese el consumo.
- Para prevenir una nueva infestación, es posible mantener algunos puntos permanentes con **KLERAT® Bloque** (puntos críticos), sólo si es estrictamente necesario y revisarlos periódicamente para detectar si hay consumo.

Cuadro General de Recomendaciones de Uso:

ROEDOR	INFESTACIÓN
Ratas y Guarenes	Colocar 1 - 2 bloques cada 5 a 10 metros
Ratones y Lauchas	Colocar 1 bloque cada 3 a 6 metros

- Si la infestación es alta utilice distancia menor de ubicación señalada en el cuadro anterior.
- Complemente el uso de **KLERAT[®]** con una correcta limpieza y aseo del lugar.
- Para interiores o ambientes secos, prefiera **KLERAT[®] Pellet**.

LISTO PARA USAR EN EXTERIOR O ZONAS HÚMEDAS

Consultas al Fono: 22 94 10100
soluciones.profesionales@syngenta.com

Brodifacoum 0,005%

RATICIDA



Contenido Neto:

syngenta

PRODUCTO DE BANDA VERDE
Cuidado



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Conservar KLERAT® en su envase original.
- Leer toda la etiqueta antes de usar el producto.
- Usar guantes para su manipulación.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.
- Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas, aves, animales, y/o personas no responsables.
- No almacenar junto con alimentos ni forrajes.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación acuda a un médico.
- En caso de ingestión, **NO** provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: (2) 2635 3800**, las 24 horas.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo. Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por boca y mantenerlo acostado de lado.

ANTÍDOTO

- Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo Protrombina, administrar **Vitamina K1 (Fitomenadiona oral o inyectable)**. **Adultos 40 mg x día y Niños menores de 12 años 20 mg x día, ambos en varias dosis.**

ACCIÓN TÓXICA

- Brodifacoum es un anticoagulante. Puede observarse hemorragia nasal o de encías, hematuria, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales y excesiva fragilidad capilar hasta varios días después de ocurrida la ingesta.

PARA EL MEDIO AMBIENTE

- Brodifacoum es extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No elimine el contenido del envase ni los roedores muertos en cursos o fuentes de agua.
- Eliminar o enterrar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.



Brodifacoum 0,005%

En caso de INTOXICACION, llamar a:

- Convenio CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2635 3800
- Syngenta S.A. (horario de oficina): (2) 2941 0100

EN CASO DE INTOXICACIÓN, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

Contenido Neto:

ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Fabricado por:

Server Química Ltda., Rua Italia 98, Marilia, Sao Paulo, Brasil.

Por Cuenta:

Syngenta Protectao de Cultivos Ltda., Sao Paulo, Brasil.

Importado y Distribuido por:

Syngenta S.A. Av. Vitacura 2939, Of. 201 - Las Condes, Teléfono: (2) 2941 0100, Santiago - Chile

Bajo licencia de Syngenta Crop Protection AG.

Registro ISP N°: P-833/18

®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

Bitrex® es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS
LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Codigo de Barra

Lote / Vencimiento: