

LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

# KLERAT®

## Cebo Blando



Brodifacoum 0,005%

### COMPOSICIÓN

**Cada 100 g de producto contiene:**

Brodifacoum (N° CAS: 56073-10-0) .....	0,005 g
Bitrex* .....	0,001 g
Otros ingredientes, csp .....	100 g

\*Benzoato de denatonium

Grupo químico: Hidroxicumarina.

Clase Toxicológica OMS: IV (Cuidado) Producto de Banda Verde.

Condición de Venta: General – Uso Doméstico

### DESCRIPCION

**KLERAT® Cebo blando** es un raticida anticoagulante de segunda generación muy efectivo contra guarenes, ratas del tejado y lauchas.

**KLERAT® Cebo blando** contiene cereales y otros animales en mezcla con aceites proteicos muy atractivos para ratas y ratones.

**KLERAT® Cebo blando** controla a roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1,3 g en ratas y 0,2 g en lauchas y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre a partir del tercer día de la primera ingesta.

**KLERAT® Cebo blando** contiene Bitrex®, amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y no siendo detectada por los roedores.

### RECOMENDACIONES DE USO

- **KLERAT® Cebo blando** es un raticida listo para usar, especialmente indicado para el control de roedores en casas (interiores y exteriores protegidos como bajo cocinas, lavadoras y lavaplatos, despensas, entretechos, closets, estantería, subterráneos), bodegas, industria, planteles animales y otros. Utilice caja cebadera o porta cebos.
- Aplicar **KLERAT® Cebo blando** tan pronto se observen las primeras señas de los roedores (fecas, huellas, roedores, etc.).
- En caso de nuevos roedores repita a aplicación a los 7 ó 14 días.
- Para prevenir una nueva infestación, es posible mantener algunos puntos permanentes con **KLERAT® Cebo blando** (puntos críticos), sólo si es estrictamente necesario y revisarlos periódicamente para detectar si hay consumo.

# KLERAT®

## Cebo Blando

Brodifacoum 0,005%

Cuadro de Recomendaciones de uso para KLERAT® Cebo Blando	
Ratas y Guarenes:	Colocar 1 a 2 sachets cada 5 a 10 metros
Lauchas o Ratones:	Colocar 1 sachet cada 3 a 6 metros

**Nota:** Los sachets o bolsitas de **KLERAT® Cebo blando** se utilizan sin necesidad de abrirlos, ya que los roedores tienen la capacidad de roerlas

- Si la infestación es alta utilice distancia menos de ubicación señalada en el cuadro anterior.
- Colocar **KLERAT® Cebo blando** donde los roedores circulen, viven o alimentan.
- Complemente el uso de **KLERAT® Cebo blando** con una correcta limpieza y aseo del lugar.
- Para ambientes y lugares húmedos prefiera **KLERAT® Bloques Parafinados**.

## LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

### Mantener Fuera del Alcance de los Niños y Mascotas

#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de abrir el envase, leer toda la etiqueta.
- Conservar **KLERAT® Cebo blando** en su envase original.
- Usar guantes para su manipulación.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Eliminar o enterrar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.
- Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.
- Mantener fuera del alcance de los niños, animales, aves y/o personas no responsables.
- No almacenar junto con alimentos.
- En caso de intoxicación acuda a un médico.
- Evitar el contacto con el suelo, vías fluviales, tuberías de desagüe y el alcantarillado. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire).

#### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, **NO** provocar vomito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: (2)26353800**, las 24 horas.
- **SIGNOS DE INTOXICACIÓN:** después de una ingesta accidental pueden aparecer hasta varios días después hemorragias de intensidad variable.

## ANTIDOTO

- Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo de Protrombina, administrar **Vitamina K1 (Fitomenadiona oral o inyectable)**. **Adultos 40 mg x día y Niños menores de 12 años 20 mg x día, ambos en varias dosis hasta que el tiempo de protrombina vuelva a la normalidad.**

En caso de **INTOXICACION**, llamar a:

- **Convenio CITUC/AFIPA (atención las 24 horas): (2) 2635 3800**
- **ADAMA Chile S.A (horario de oficina): (2) 2855 0048**
- **Syngenta S.A (horario de oficina): (2) 2941 0100**

**EN CASO DE INTOXICACION, MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**

**Fabricado por:** KOLLANT SRL. -Empresa do grupo Adama, Via C. Colombo 7/7 A, 30030, Vigonovo (Venecia) Italia.

**Importado y Distribuido por:** Syngenta S.A Isidora Goyenechea N°2800, oficina 3701- Las Condes, teléfono (2) 3322 5850

**Registro ISP N° P-979/22.**

**KLERAT®:** Marca Registrada de una compañía del grupo Syngenta.

**BITREX®** es marca registrada de Mac-Farland Smith, Inglaterra.

**Consultas al Fono: 2 3322 5850**

**Soluciones.profesionales@syngenta.com**

RATICIDA EN CEBO BLANDO

**KLERAT**<sup>®</sup>  
Cebo Blando

Brodifacoum 0,005%

REG ISP N° P-979/22

Clase IV OMS  
"Cuidado, puede ser peligroso"



CONTENIDO neto:

N°de Lote:

KLERAT<sup>®</sup> Cebo blando