



FICHA TÉCNICA

# FARGO SC



COMPOSICIÓN	Lambdacihalotrina ..... 3,6 % p/v Imidacloprid ..... 1,6 % p/v
REGISTRO ISP	P-1014/24
CLASE TOXICOLÓGICA	Clase III OMS, ligeramente peligroso
FORMATOS	Envases de 1 lt.



**FARGO SC** es un insecticida en base a agua, libre de solventes bencénicos, ideal para tratamientos residuales interiores o exteriores, y elaborado para ser usado en superficies lisas (vidrios, cerámicas), absorbentes (maderas, ladrillos, cerámicas, otras) o sobre diferentes superficies complejas (con polvo, grasa). **FARGO SC** es una asociación de Lambdacihalotrina, piretroide de cuarta generación e Imidacloprid, eficaz neonicotínico de amplio espectro. Esta asociación permite lograr excelentes efectos expulsivos, de volteo y una residualidad única dada por la potente asociación de ambos ingredientes activos.

**FARGO SC** que posee un tamaño de partícula de 10 micras, lo que permite permanecer más establemente sobre la superficie tratada al momento de depositarse sobre la superficie. Además, posee un novedoso excipiente, SPH (Sílice Pirogénico Hidrofílico) un efectivo coadyuvante silicado que facilita la liberación controlada de los ingredientes activo, favoreciendo su residualidad.

**FARGO SC** es un producto para ser usado por aspersión y Ultra bajo volumen con tamaños de gota de 20 micras o más. Posee un amplio espectro insecticidas, siendo de primera elección para el control residual de insectos voladores y rastreros.



## DOSIS .....

TIPO DE INSECTOS	LUGAR	DOSIS POR ASPERSIÓN
VOLADORES (moscas, polillas, zancudos)	Interior	50 ml/ 5 litros / 100 m <sup>2</sup>
	Exterior	60 mL/ 5 litros / 100 m <sup>2</sup>
RASTREROS (cucarachas, chinches, hormigas, tijeretas, arañas, pulgas garrapatas)	Interior	50 mL/ 5 litros / 100 m <sup>2</sup>
	Exterior	70 mL/ 5 litros / 100 m <sup>2</sup>

Para obtener el mejor resultado, se recomienda aplicar Fargo por aspersión.

Tiempo de reingreso: 2 horas post aplicación.

- Se recomienda su dilución en agua limpia, a temperatura ambiente.
- Usar la dosis mayor en caso de alta carga de plaga.
- Insectos Voladores: Aplicar dependiendo del nivel de infestación, rociado las superficies de paredes, ventanas y áreas verdes donde los insectos descansan y se reproducen.
- Insectos Rastreros: Aplicar donde generalmente viven y anidan, como: grietas, esquinas del piso, al interior de closet, bajo muebles, etc.

## RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES .....

- Utilice guantes, overall y botas de goma al momento de la preparación del producto.
- Fargo se diluye con agua limpia, a temperatura ambiente y puede ser usado por aspersión manual o a motor.
- Mantenga el producto fuera del alcance de personas inexpertas, niños y animales.
- No permita el contacto con alimentos o agua de consumo.
- Evite inhalar o ingerir el producto.
- Almacene en un lugar seco, fresco y ventilado, fuera del alcance de personas inexpertas y animales.
- No coma, fume o beba durante la aplicación.
- Tóxico para abejas y animales acuáticos. Se debe evitar la contaminación de cursos de agua, como lagos, ríos canales, acequias y otros.
- Una vez vacío el envase, haga triple lavado y elimine el envase según la regulación vigente.